

## ЗДОРОВЬЕ САДА ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ ВЕСНОЙ

**П**ервый осмотр садового участка нужно провести ранней весной – в самом начале пробуждения почек смородины, когда начинается развитие почкового клеща. Заселенные вредителем почки отличаются от здоровых увеличенными (в 3-4 раза) размерами (см. фото). Такие почки следует уничтожить до начала миграции и расселения клеща.

Если в предыдущем году не успели удалить засохшие ветки и побеги, поврежденные стеклянницей и златкой, сделайте это сейчас – вырежьте до основания и сожгите.

В предыдущем сезоне в местных лесах и лесополосах отмечалась вспышка массового раз-

множения непарного шелкопряда. Вредитель мог заселить и ваш участок – на штамбах деревьев внизу хорошо заметны желтовато-серые войлочные подушечки яйцекладок, их соскребают и уничтожают.

Против комплекса болезней в ранневесенний период (в начале распускания почек) рекомендуется обработка бордоской жидкостью. В этом случае она почти не оказывает отрицательного действия на защищаемую культуру. Бордоская жидкость применяется в 3%-ной концентрации: 300 г медного купороса и 400 г извести на 10 л воды (растворяют каждый компонент отдельно в воде, потом голубой раствор вливают в белый – только в такой последовательности!). Готовым раствором обрабатывают яблони, груши против парши, пятнистостей, монилиоза, плодовой гнили; косточковые – против дырчатой и красной пятнистостей, коккомикоза, монилиального ожога; малину, ежевику, землянику – против различных пятнистостей. Целесообразно применять бордоскую жидкость в период «начало распускания почек», а позднее использовать Абига-Пик, оксихлорид меди, купроксат и другие.

**В. Кривко, заведующая  
фитосанитарной  
лабораторией  
Референтного центра  
Россельхознадзора  
по Омской области.**

