ДАЧНЫЙ СЕЗОН
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЧЕТВЕРГА» ДЛЯ ОМСКИХ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ
ВЫПУСК 52

БИТВА ЗА РАННИЙ УРОЖАЙ

Сибирь – зона рискованного земледелия, возвратными заморозками в мае и даже в июне садоводов не удивишь. И тем интереснее вырастить ранний урожай. Теплица, выбор семян раннего срока созревания, правильная агротехника выращивания (полив, подкормки) – и вот уже можно собирать первые плоды.

Традиционная весенняя зелень – это лук-батун, салаты, редиска. За последние 20 лет появилось много семян овощей очень раннего срока созревания – в первую очередь это огурцы и кабачки. Среди томатов также большой выбор раннеспелых гибридов.

«То, что ранний урожай со своей грядки кажется особенно вкусным – это логично, ведь столько труда в него вложено, – говорит Наталья Васенина, эксперт нашей огородной рубрики. – Конечно, очень приятно собирать урожай огурцов на две, а то и на три недели раньше, чем принято. Но есть пословица «овчинка выделки не стоит», и про неё не забываем. Можно приложить много усилий, но природу не обманешь: у каждого овоща свой срок плодоношения».

В самом начале сезона актуальная тема – как прогреть грунт в теплице. Здесь поможет чёрный нетканый материал: им укрывают грядки на неделю перед посевом ранних овощей (редиски, салатов). А вот полив грядок в теплице кипятком считается не только бесполезным, но и вредным. Во-первых, это хлопотно, во-вторых, уже спустя считанные минуты земля снова станет холодной. В-третьих, от кипятка погибают полезные микроорганизмы в грунте.

ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Какая температура оптимальна для высадки основных тепличных обитателей – огурцов и помидоров? 15 °С в затенённом месте. Температура почвы важнее показателя температуры воздуха. В холодной земле семена огурцов будут долго всходить. Если высаживаете их рассадой, то учтите: при температуре почвы ниже 15 °С огурцы перестают расти. А в период образования завязей нежелательно снижение температуры ниже +19°С.

Самая комфортная температура для огурца: +25. При +33°С и выше растение прекратит формировать завязи, а уже имеющиеся огурчики начнут сохнуть.

Томаты дружно растут при +25°С в сочетании с высокой освещённостью. При температуре ниже +15 °С помидоры также замедляют развитие.

РЕКЛАМА

Внимание, конкурс!

РАННИЕ И УЛЬТРАРАННИЕ СОРТА

Огурцы считаются раннеспелыми, если дают урожай за 40–49 дней. Ультраранние гибриды огурцов порадуют урожаем через 35–39 дней с момента появления всходов. В магазинах большой выбор ранних и ультраранних по срокам созревания огурцов, поэтому называть конкретные экземпляры нецелесообразно, надо выбирать самому.

У кабачков такие же сроки по созреванию урожая: от 35 дней с момента появления всходов. Особенность раннеспелых сортов кабачков – тонкая кожица, поэтому они долго не хранятся. Хорошие характеристики огородников получили следующие сорта ранних кабачков: белоплодные Арал и Белогор, Дракоша (у плодов этого сорта зелёная шкурка).

Картофель раннего срока созревания называют сорокадневкой: за этот период он даёт урожай. Популярные сорта раннего картофеля: Бриз, Винета, Жуковский ранний, Импала, Метеор, Снегирь, Тимо, Удача, Чароит.

Среди редиса самый известный ранний сорт – это, пожалуй, 18 дней. Также порадуют ранним урожаем сорта Алёшка, Клюква в сахаре, Детский, Глобус, Спринтер.

«Независимо ни от чего, для раннего урожая есть одно общее правило: простор на грядке, чтобы растения не тратили силы на борьбу за место под солнцем, подкормки и полив», – рассказывает Наталья Васенина.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Замачивание семян перед посевом, тёплый плодородный грунт – без этого не вырастить ранний урожай. Но есть ещё и «тяжёлая артиллерия» – это ускорители роста растений. Применять их или нет на своём участке – тут каждый огородник решает сам. Вырабатываемые растениями фитогормоны делятся на 4 группы; чтобы помочь растениям быстрее расти и развиваться, применяют их синтетические заменители.

Ауксины обеспечивают развитие корневой системы. Гиббереллины отвечают за прорастание семян, цветение и формирование плодов, также повышают урожайность, выводят из состояния покоя клубни и луковицы. Гиббереллины, в отличие от ауксинов, не перераспределяют полезные вещества, а только накапливают. Цитокинины способствуют делению клеток, как результат – содействуют пробуждению и росту почек, а ещё регулируют процесс старения листьев. Брассины отвечают за иммунитет растений, повышают устойчивость к неблагоприятным факторам среды и болезням.

Страницу подготовила Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.